

摄影报道



榆叶梅（花期4月中下旬）

榆叶梅又叫小桃红,因其叶片像榆树叶,花朵酷似梅花而得名。枝紫褐色,叶宽椭圆形至倒卵形,先端3裂状,缘有不等粗重锯齿。花单瓣至重瓣,紫红色,1~2朵生于叶腋,花期4月;核果红色,近球形,有毛。本种开花早,主要供观赏。



山杏（花期4月）

山杏花萼为紫红色,筒钟形,基部微被短柔毛或无毛;萼片长圆状椭圆形,先端尖,花后反折;花瓣近圆形或倒卵形,白色或粉红色;雄蕊几与花瓣近等长。



多季玫瑰（花期6月）

高山小玫瑰学名四季玫瑰,又称多季玫瑰,属蔷薇科蔷薇属。有枝紫叶绿花红、香味浓郁、多次开花、花色瑰丽、花期长的特点,可夏秋赏花、秋季看果、冬春观枝,是市区园林美化的主要树种之一。



九角枫（花期5月）

花10~16朵,杂性,同株,后于叶开放,花轴初有短疏毛,后渐脱落。翅果褐色,长约2.5厘米;小坚果凸出呈长卵圆形,生有微毛;翅长约1.6厘米,宽约7毫米。花期5~6月,果期9月。



榆树（花期5月）

榆树为两性花,紫褐色,阳性树种喜光,耐旱,耐寒,耐瘠薄,不择土壤,适应性很强。根系发达,抗风力、保土力强。萌芽力强,耐修剪。生长快,寿命长。具抗污染性,叶面滞尘能力强。



鸡树条荚蒾（花期5月）

花冠白色,辐状,花药黄白色,不孕花白色,果实红色,近圆形,5~6月开花,果熟期9~10月。分布于吉林、辽宁、河北北部、山西、陕西南部等地。该种枝叶可通经活络,解毒止痒,枝可用于风湿性关节炎,腰酸腿痛,跌打损伤。



毛樱桃（花期4月）

花芽最大,花先叶开放,白色至淡粉红色,萼片红色,果实发育期45~55天,5月下旬至6月初成熟。观赏毛樱桃树形优美,花朵娇小,果实艳丽,是集观花、观果、观型为一体的园林观赏植物。



珍珠绣线菊（花期4~5月）

花3~7朵,基部簇生数枚小形叶片;萼筒钟状,萼片三角形或卵状三角形,花瓣倒卵形或近圆形,白色;花盘圆环形,子房无毛或微被短柔毛,蓇葖果开张,4~5月开花,7月结果。

“春风徐来,不经意间人们已发现,无论是公园、路旁抑或是山谷,连翘、桃花、冰凌花等已经盛开绽放,五颜六色的花朵不仅让人们尽情享受着充满浪漫诗意的春天,也点缀着人们精彩的生活。除了这些已经盛开的花朵,城市晚报全媒体记者在长春市百木园踏查时发现,还有很多花朵也正处于含苞待放阶段,很快就要和大家见面。那么这些都是什么花呢?开花后又都是什么颜色的?昨日记者邀请百木园管理所所长刘培生提前为大家“揭秘”。

这个春天因五颜六色的花朵而充满浪漫和诗意

这些含苞待放的花蕾你们认识吗?

·提示·

爱护花草树木
做到文明赏花

长春市百木园内很多花朵即将盛开绽放,对此刘培生所长也表示,他们会加大花期养护管理工作,为游人提供优美惬意的游园环境,同时也呼吁广大游客朋友在游园赏花的同时,要爱护园区的花草树木,做到文明赏花。在游览观赏时,请不要踩踏、采摘景观中的花草,拍照时也请不要出现折枝等行为。

同时也提醒花粉过敏的朋友,如遇风天或天气晴好的日子要减少外出,少去花草树木茂盛的地方。如果到了花粉多的场所,最好戴上眼镜和口罩,做好防护,切断传播途径。

/城市晚报全媒体记者 吕闯 实习生 张铭轩 报道 蒋盛松 摄



红王子锦带（花期5~9月）

株型美观,枝条修长,叶色独特,花朵稠密,花红艳丽,灿如锦带。花期5~9月,10月果熟,11月下旬落叶。盛花期孤植株形似红球,即使在盛花期过后,红花点缀绿叶之中,也甚为美观,具有很高的观赏价值。



稠李（花期4~5月）

总状花序具有多花,长7~10厘米,基部通常有2~3叶。核果卵球形,顶端有尖头,花期4~5月,果期5~10月。分布于吉林、辽宁、黑龙江等地,欧洲和北亚长期栽培,有垂枝、花叶、大花、小花、重瓣、黄果和红果等变种,供观赏用。



紫丁香（花期5~6月）

嫩叶簇生,后对生,卵形,倒卵形或披针形,圆锥花序,花淡紫色、紫红色或蓝色,花冠筒长6~8毫米。花期5~6月。生长习性喜阳,喜土壤湿润而排水良好,适庭院栽培,春季盛开时硕大而艳丽,花序布满全株,芳香四溢,观赏效果甚佳,是庭园栽种的著名花木。




海棠（花期4~5月）

花序近伞形,有花4~6朵,花梗长2~3厘米,具柔毛。花瓣卵形,长2~2.5厘米,宽1.5~2厘米,基部有短爪,白色,在芽中呈粉红色。花期4~5月,果期8~9月。海棠为中国著名观赏树种,各地悉见栽培。园艺变种有粉红色重瓣者和白色重瓣者。



迎红杜鹃（花期4~6月）

花期4~6月,果期5~7月,产于我国内蒙古、辽宁、河北、山东、江苏北部。花序腋生枝顶或假顶生,1~3花,先叶开放,伞形着生。因其花长得美丽,具有栽培和园艺价值。



忍冬（花期4~6月）

花冠白色,有时基部向阳面呈微红,后变黄色,唇形,外被倒生的开展或半开展糙毛和长腺毛,上唇裂片顶端钝形,下唇带状而反曲;雄蕊和花柱均高出花冠。果花期4~6月(秋季亦常开花)。忍冬花性甘寒,功能清热解毒、消炎退肿,对细菌性痢疾和各种化脓性疾病都有效。



山桃（花期3~4月）

花单生,先于叶开放,花萼无毛;萼筒钟形;萼片卵形至卵状长圆形,紫色,花瓣倒卵形或近圆形,粉红色,果实近球形,淡黄色,果肉薄而干,不可食,成熟时不开裂;3~4月开花,7~8月结果。



柳树（花期3~4月）

柳树单性,雌雄异株;柔荑花序先叶开放或与叶同时开放;总梗有短柔毛;苞片圆形至线状披针形,早落;雄花有2腺体,雄蕊2,分离,基部具长柔毛;雌花有一腺体,子房无毛,无柄,花柱极短,柱头2裂。蒴果长3~4毫米,带绿褐色,成熟后2裂。种子有绵毛。花期3~4月,果期4~5月。